

BRA[®] up to 30% TCA

Biocell Rejuvenation Activator



RIGENERA
LA TUA PELLE

Il peeling *ad hoc* sicuro, efficace e facile da utilizzare
contro **macchie, rughe e imperfezioni**



BRA[®] up to 30% TCA

Un meccanismo d'azione originale:

- esfolia (TCA, fino al 30%)
- stimola la sintesi di collagene (L-Vitamina C, 10%)
- protegge dagli stress ossidativi (L-Vitamina C, Acido Fitico, Sistema Modulatore ROS)
- evita il rebound pigmentario (L-Vitamina C, Acido Fitico, Sistema Modulatore ROS)

**Risultati: ringiovanisce la pelle, ne migliora il colorito
e corregge le imperfezioni cutanee**

AURIGA
INTERNATIONAL

ADVANCE IN DERMATO-COSMETOLOGY

BRA[®] up to 30% TCA

Biocell Rejuvenation Activator

PEELING AD HOC - SEMPLICE DA USARE

PROTOCOLLO DI APPLICAZIONE:

1. Preparazione del paziente

- detergere la pelle con Pre-Peel Solution per rimuovere l'eccesso di sebo e le impurità
- proteggere gli occhi del paziente, le labbra, le narici e qualsiasi altra area sensibile con vaselina

2. Preparazione della soluzione peeling (una dose*)

- utilizzando la pipetta di plastica, prelevare 3 ml di Base Solution for Peeling (soluzione base per peeling - boccetta bianca). Mettere il contenuto della pipetta nella boccetta vuota preposta all'uso (boccetta di miscelazione)
- prelevare una o due dosi da 0.6 ml di soluzione concentrata di TCA (boccetta trasparente) utilizzando la pipetta di vetro e metterla nella boccetta di miscelazione
- mescolare adeguatamente, utilizzando ad esempio la pipetta di plastica

Soluzione Base (boccetta bianca)	Soluzione TCA concentrato (boccetta trasparente)	Soluzione Peeling
Numero pipette in plastica (3 ml)	Numero pipette in vetro (0.6 ml)	Concentrazione % (m/v)
1	1	15%
1	2	30%

* Per un uso standard, una dose costituisce la quantità sufficiente per il trattamento di un solo paziente. Non conservare o riutilizzare la soluzione peeling preparata.

3. Applicazione della soluzione peeling

- applicare la soluzione peeling uniformemente con il pennello, a partire dalla fronte, le guance, il mento e il naso. Terminare con una leggera applicazione al contorno occhi. Ripetere l'operazione dopo qualche minuto, se necessario, (massimo 3 applicazioni per seduta). Sciacquare accuratamente il pennello, le pipette e la boccetta, con acqua dopo l'uso
- Dopo la seduta, il paziente deve rimanere in osservazione medica per 15 minuti per controllare che non vi sia alcuna reazione. Si può osservare un eritema o un frost a seconda della concentrazione del peeling. Il paziente può avvertire un lieve formicolio o una sensazione di calore
- La soluzione peeling deve rimanere in azione da 3 a 6 ore, durante le quali il paziente può svolgere le sue attività. Trascorso questo tempo, il paziente risciacquerà la zona trattata con acqua fresca o lavandosi
- Dopo 48/72 ore si osserverà una desquamazione più o meno superficiale a seconda della concentrazione del peeling

Note

- Non neutralizzare. Il risciacquo con acqua sarà sufficiente, ma non prima di 3 - 6 ore dall'applicazione
- Per ottenere risultati ottimali, saranno necessarie più sessioni di applicazione
- Procedere con la successiva seduta solo a completa riparazione tissutale (10/12 giorni con BRA 15% - 20/30 giorni con BRA 30%)

Osservazioni particolari

BRA[®] Evolutive kit peeling deve essere conservato al di sotto dei 25°.
Il trattamento è ad esclusivo uso medico.

